

LISTA DE CAMPO DE LA RESERVA COSTANERA SUR - AVES REGISTRADAS (2011/2012)

Cora Rimoldi y Germán Pugnali - www.reservacostanera.com.ar

| Anhimidae | Ardeidae | Aramidae | Laridae (cont) | Trochilidae (cont) | Furnariidae |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| III Chajá VP <i>Chauna torquata</i> | I Hoco colorado VP-C <i>Tigrisoma lineatum</i> | III Carau EA <i>Aramus guarauna</i> | F Gaviotín lagunero EA-C <i>Sterna trudeaui</i> | I Picaflor bronceado A-B <i>Hylocharis chrysur</i> | I Chinchero chico B <i>Lepidocolaptes angustirostris</i> |
| | F Mirasol común VP <i>Ixobrychus involucris</i> | | | | I Hornero T-P-B <i>Furnarius rufus</i> |
| Anatidae | | Rallidae | Rynchopidae | Alcedinidae | |
| III Sirirí colorado C - EA <i>Dendrocygna bicolor</i> | III Garza bruja VP <i>Nycticorax nycticorax</i> | II Ipacaá VP-T <i>Aramides ypecaha</i> | F Rayador EA-C <i>Rynchops niger</i> | F Martín pescador grande C <i>Megasceryle torquata</i> | II Junquero VP <i>Phleocryptes melanops</i> |
| III Sirirí pampa C - EA <i>Dendrocygna viduata</i> | III Garcita azulada VP <i>Butorides striata</i> | I Chiricote VP-T <i>Aramides cajaneus</i> | | | I Remolinera común T <i>Cinclodes fuscus</i> |
| III Cisne cuello negro C - EA <i>Cygnus melancoryphus</i> | II Garza mora VP-C <i>Ardea cocoi</i> | II Burrito común VP <i>Laterallus melanophaius</i> | Columbidae | Picidae | |
| III Coscoroba C - EA <i>Coscoroba coscoroba</i> | I Garza blanca EA-C <i>Ardea alba</i> | F Burrito negro VP <i>Porzana spiloptera</i> | III Torcacita común B-T <i>Columbina picui</i> | I Carpintero bataraz chico B <i>Veniliornis mixtus</i> | I Espinero pecho manchado A-B-P <i>Phacellodomus striatocollis</i> |
| III Pato de collar C - EA <i>Callonetta leucophrys</i> | III Chifflón VP <i>Syrigma sibilatrix</i> | II Gallineta común VP <i>Pardirallus sanguinolentus</i> | I Paloma doméstica B-T <i>Columba livia</i> | I Carpintero real B-P-T <i>Colaptes melanochloros</i> | III Canastero coludo A-P <i>Asthenes pyrrholeuca</i> |
| III Pato cutirí C - EA <i>Amazonetta brasiliensis</i> | II Garcita blanca C <i>Egretta thula</i> | III Pollona negra C-VP <i>Gallinula chloropus</i> | I Paloma picazuro B-T <i>Patagioenas picazuro</i> | II Carpintero campestre B-T <i>Colaptes campestris</i> | III Curutié ocráceo P <i>Cranioleuca sulphurifera</i> |
| III Pato barcino C - EA <i>Anas flavirostris</i> | Threskiornitidae | III Pollona pintada C-VP <i>Gallinula melanops</i> | I Torcaza común B-T <i>Zenaida auriculata</i> | | II Curutié colorado VP <i>Schoeniophylax phryganophilus</i> |
| III Pato maicero C - EA <i>Anas georgica</i> | III Cuervillo de cañada EA <i>Plegadis chihi</i> | III Gallareta ligas rojas C-VP <i>Fulica armillata</i> | I Yeruti común B <i>Leptotila verreauxi</i> | Falconidae | III Pijuí plumizo A-B-P <i>Synallaxis spixi</i> |
| III Pato capuchino C - EA <i>Anas versicolor</i> | III Cuervillo cara pelada EA <i>Phimosus infuscatus</i> | III Gallareta escudete rojo C-VP <i>Fulica rufifrons</i> | Cuculidae | II Chimango EA-B-P <i>Milvago chimango</i> | I Pijuí frente gris A-B-P <i>Synallaxis frontalis</i> |
| III Pato picazo C - EA <i>Netta peposaca</i> | III Espátula rosada EA <i>Platalea ajaja</i> | III Gallareta chica C-VP <i>Fulica leucoptera</i> | II Cucillo canela B <i>Coccyzus melancoryphus</i> | II Halconcito colorado EA <i>Falco sparverius</i> | Tyrannidae |
| Podicipedidae | Cathartidae | Charadriidae | I Pirincho A-B-P-T <i>Guira guira</i> | F Halcón plumizo VP <i>Falco femoralis</i> | F Fiofio grande B <i>Elaenia spectabilis</i> |
| III Macá grande C <i>Podiceps major</i> | F Jote cabeza colorada EA <i>Cathartes aura</i> | II Tero común VP <i>Vanellus chilensis</i> | Strigidae | Psittacidae | III Fiofio silbón B <i>Elaenia albiceps</i> |
| Phoenicopteridae | Accipitridae | Scolopacidae | III Caburé chico A-B <i>Glauclidium brasilianum</i> | III Calancate ala roja EA-B <i>Aratinga leucophthalma</i> | I Fiofio pico corto B <i>Elaenia parvirostris</i> |
| III Flamenco C <i>Phoenicopus chilensis</i> | F Milano blanco EA-B <i>Elanus leucurus</i> | F Becasina VP <i>Gallinago paraguaiae</i> | III Lechuzón orejudo B <i>Pseudoscops clamator</i> | I Nanday B <i>Nandayus nenday</i> | III Piojito silbón B <i>Campostoma obsoletum</i> |
| | III Caracolero EA-VP <i>Rostrhamus sociabilis</i> | Jacaniidae | Caprimulgidae | III Catita chirirí EA-B <i>Brotogeris chiriri</i> | F Suirirí común B <i>Suiriri suiriri</i> |
| III Cigüeña EA-VP <i>Ciconia maguari</i> | F Gavilán ceniciento EA-VP <i>Circus cinereus</i> | III Jacana VP <i>Jacana jacana</i> | III Atajcaminos tijera B-P <i>Hydropsalis torquata</i> | I Cotorra EA-B-A <i>Myiopsitta monachus</i> | III Cachudito pico amarillo A <i>Anairetes flavirostris</i> |
| III Tuyuyú EA <i>Mycteria americana</i> | III Gavilán planeador EA-VP <i>Circus buffoni</i> | Laridae | Trochilidae | F Loro hablador B <i>Amazona aestiva</i> | III Piojito gris VP <i>Serpophaga nigricans</i> |
| Phalacrocoracidae | I Taguató común EA-B <i>Rupornis magnirostris</i> | II Gaviota capucho café EA-C <i>Chroicocephalus maculipennis</i> | I Picaflor común A-B <i>Chlorostilbon lucidus</i> | Thamnophilidae | I Piojito común A-B <i>Serpophaga subcristata</i> |
| I Biguá C <i>Phalacrocorax brasilianus</i> | I Gavilán mixto EA-B <i>Parabuteo unicinctus</i> | I Gaviota cocinera EA-C <i>Larus dominicanus</i> | F Picaflor garganta blanca A-B <i>Leucochloris albicollis</i> | F Choca corona rojiza A-B <i>Thamnophilus ruficapillus</i> | I Piojito trinador A-B <i>Serpophaga griseicapilla</i> |

HÁBITAT: VP: Vegetación palustre - EA: Espacio aéreo - A: Arbustal - B: Bosque - P: Pastizal - T: Terraplén - C: Costa del río. ESTATUS/ESTACIONALIDAD: R: Residente - RI: Residente Invernal - RV: Residente Estival - MB: Migrante estival no nidificante en esta zona - MA: Migrante

estival nidificante en esta zona - MAP: Migrante invernal no nidificante en esta zona - FD: Fuera de zona de distribución - FDE: FZD Establecido. DETECTABILIDAD: I: Alta - II: Media - III: Baja - F: Fortuito

OBSERVACIONES:

LISTA DE CAMPO DE LA RESERVA COSTANERA SUR - AVES REGISTRADAS (2011/2012)

Cora Rimoldi y Germán Pugnali- www.reservacostanera.com.ar

| Tyrannidae (cont.) | Tyriridae (cont.) | Mimidae | Thraupidae (cont.) | Cardinalidae (cont.) | Icteridae (cont.) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| III Doradito común VP-P <i>Pseudocolaptes flaviventris</i> R | I Anambé común B <i>Pachyramphus polychopterus</i> MA | I Calandria grande A-T <i>Mimus saturninus</i> R | III Corbatita dominó P-VP <i>Sporophila collaris</i> MA | III Pepitero verdoso B <i>Saltator similis</i> R | III Varillero negro VP <i>Agelasticus cyanopus</i> R |
| F Barullero A.B <i>Euscarthmus meloryphus</i> R | Vireonidae | | I Corbatita común P-A <i>Sporophila caerulescens</i> R | I Pepitero de collar A-B <i>Saltator aurantirostris</i> R | II Varillero ala amarilla VP <i>Agelasticus thilius</i> R |
| II Tachuri sietecolores VP <i>Tachuris rubrigastra</i> R | I Chiví común B <i>Vireo olivaceus</i> MA | Sturnidae | | Parulidae | |
| I Mosqueta estriada A-B <i>Myiophobus fasciatus</i> MA | Corvidae | | F Capuchino garganta café P <i>Sporophila ruficollis</i> MA | II Pitiayumí B <i>Parula pitiayumi</i> MAP | I Varillero congo VP <i>Chrysomus ruficapillus</i> R |
| I Churrinche A-B <i>Pyrocephalus rubinus</i> MA | III Urraca común B <i>Cyanocorax chrysops</i> FDE | Thraupidae | | Icteridae | |
| F Sobrepuesto T <i>Lessonia rufa</i> MAP | Hirundinidae | | I Cardenal común T-A-B <i>Paroaria coronata</i> R | I Arañero cara negra A-VP-B <i>Geothlypis aequinoctialis</i> MA | F Pecho amarillo común VP-P <i>Pseudoleistes virescens</i> R |
| III Viudita pico celeste B <i>Knipolegus cyanirostris</i> RI | II Golondrina barranquera EA <i>Pygochelidon cyanoleuca</i> R | II Cardenilla VP-T <i>Paroaria capitata</i> R | Cardinalidae | | I Tordo músico T-A-P <i>Agelaioides badius</i> R |
| I Pico de plata A-B-T <i>Hymenops perspicillatus</i> R | I Golondrina parda EA-B <i>Progne tapera</i> MA | F Tangará gris B <i>Thlypopsis sordida</i> R | III Fuego común B <i>Piranga flava</i> R | I Arañero coronado chico B <i>Basileuterus culicivorus</i> R | II Tordo pico corto A-T <i>Molothrus rufoaxillaris</i> R |
| II Suirirí amarillo VP-P-A <i>Satrapa icterophrys</i> R | I Golondrina doméstica EA-B <i>Progne chalybea</i> MA | I Frutero negro B <i>Tachyphonus rufus</i> R | F Rey del bosque B <i>Pheucticus aureoventris</i> FD | Icteridae | |
| II Dormilona cara negra T <i>Muscisaxicola maclovianus</i> MAP | F Golondrina negra EA <i>Progne elegans</i> MA | III Saíra de antifaz B <i>Pipraeidea melanonota</i> RI | F Reinamora chica B <i>Cyanoloxia glaucoacaerulea</i> MA | III Matico B <i>Icterus croconotus</i> FDE | Fringillidae |
| F Viudita blanca VP <i>Fluvicola albiventer</i> MA | I Golondrina ceja blanca EA-B <i>Tachycineta leucorrhoa</i> MA | II Naranjero B <i>Pipraeidea bonariensis</i> R | II Reinamora grande A-B <i>Cyanocompsa brissonii</i> R | III Turpial B <i>Icterus jamacaii</i> FDE | I Tordo renegrido T-A <i>Molothrus bonariensis</i> R |
| II Picabuey T-P <i>Machetornis rixosa</i> R | I Golondrina patagónica EA <i>Tachycineta meyeni</i> MAP | II Celestino B <i>Thraupis sayaca</i> R | III Pepitero gris B <i>Saltator coerulescens</i> R | I Boyero negro B <i>Cacicus solitarius</i> R | III Pecho colorado P <i>Sturnella superciliaris</i> MA |
| I Benteveo común VP-A-P <i>Pitangus sulphuratus</i> R | F Golondrina tijereta EA <i>Hirundo rustica</i> MB | III Yal negro P-A <i>Phrygilus fruticeti</i> MAP | Icteridae | | Fringillidae |
| I Benteveo rayado B <i>Myiodynastes maculatus</i> RV | Troglodytidae | | II Reinamora grande A-B <i>Cyanocompsa brissonii</i> R | I Boyerito A-B <i>Icterus cayanensis</i> R | I Cabecitanegra común B-P-A <i>Sporagra magellanica</i> R |
| I Suirirí real B-P <i>Tyrannus melancholicus</i> MA | I Ratona común A-P-B <i>Troglodytes aedon</i> R | II Cachilo canela P-A <i>Donacospiza albifrons</i> R | III Reinamora grande A-B <i>Cyanocompsa brissonii</i> R | III Federal VP <i>Amblyramphus holosericeus</i> R | Passeridae |
| I Tijereta B-P <i>Tyrannus savana</i> MA | Poliptilidae | | III Pepitero gris B <i>Saltator coerulescens</i> R | I Gorrión T-A <i>Passer domesticus</i> FDE | |
| F Burlisto pico canela B <i>Myiarchus swainsoni</i> MA | I Tacuarita azul A-B <i>Poliptila dumicola</i> R | II Monterita cabeza negra B <i>Poospiza melanoleuca</i> R | Troglodytidae | | |
| Cotingidae | | I Jilguero dorado A-P <i>Sicalis flaveola</i> R | Troglodytidae | | |
| II Cortarramas A-B <i>Phytotoma rutila</i> MAP | I Zorzal colorado A-B-P-T <i>Turdus rufiventris</i> R | III Misto P-A <i>Sicalis luteola</i> R | Troglodytidae | | |
| Tyriridae | | II Verdón P-A-T <i>Embernagra platensis</i> R | Troglodytidae | | |
| F Anambé verdoso B <i>Pachyramphus viridis</i> R | F Zorzal chiguanco B-A-P <i>Turdus chiguanco</i> FD | III Volatinero MA <i>Volatinia jacarina</i> MA | Troglodytidae | | |

L: Lagunas temporalmente sin agua (en proceso de recuperación). En las zonas más bajas persiste vegetación palustre. En las más altas domina el pastizal.

B: Las áreas boscosas ganan terreno uniformizando el paisaje

VP: Vegetación palustre

C: Costa del río

P: Pastizal



HÁBITAT: VP: Vegetación palustre - EA: Espacio aéreo - A: Arbustal - B: Bosque - P: Pastizal - T: Terraplén - C: Costa del río. ESTATUS/ESTACIONALIDAD: R: Residente - RI: Residente Invernal - RV: Residente Estival - MB: Migrante estival no nidificante en esta zona - MA: Migrante estival nidificante en esta zona - MAP: Migrante invernal no nidificante en esta zona - FD: Fuera de zona de distribución - FDE: FZD Establecido. DETECTABILIDAD: I: Alta - II: Media - III: Baja - F: Fortuito

OBSERVACIONES: