

LISTA DE CAMPO DE LA RESERVA COSTANERA SUR - AVES REGISTRADAS (Mayo 2014- Abril 2015)

Cora Rimoldi, J. Simón Tagtachian y Germán Pugnali - www.reservacostanera.com.ar

Anhimidae	Phoenicopteridae	Accipitridae (cont.)	Rallidae (cont.)	Columbidae (cont.)	Picidae (cont.)
<b>F</b> Chajá VP <i>Chauna torquata</i> R	<b>F</b> Flamenco C <i>Phoenicopus chilensis</i> RV	<b>III</b> Caracolero L-VP <i>Rosthramus sociabilis</i> R	<b>II</b> Gallareta chica L-VP <i>Fulica leucoptera</i> R	<b>I</b> Torcaza común B-T <i>Zenaida auriculata</i> R	<b>I</b> Carpintero real B-P-T <i>Colaptes melanochloros</i> R
<b>II</b> Sirirí colorado L <i>Dendrocygna bicolor</i> R	<b>III</b> Cigüeña EA-VP <i>Ciconia maguari</i> R	<b>III</b> Gavilán planeador EA-VP <i>Circus buffoni</i> R	<b>Charadriidae</b> <b>I</b> Tero común VP <i>Vanellus chilensis</i> R	<b>I</b> Yerutí común B <i>Leptotila verreauxi</i> R	<b>II</b> Carpintero campestre B-T <i>Colaptes campestris</i> R
<b>I</b> Sirirí pampa L <i>Dendrocygna viduata</i> R	<b>F</b> Tuyuyú EA-VP <i>Mycteria americana</i> R	<b>I</b> Taguató común EA-B <i>Rupornis magnirostris</i> R	<b>Recurvirostridae</b> <b>F</b> Tero real L <i>Himantopus mexicanus</i> R	<b>Cuculidae</b> <b>F</b> Cuculillo chico B <i>Coccyzus cinerea</i> MA	<b>Falconidae</b> <b>I</b> Carancho EA-B-P <i>Caracara plancus</i> R
<b>F</b> Cisne cuello negro L <i>Cygnus melancoryphus</i> R	<b>Phalacrocoracidae</b> <b>I</b> Biguá C <i>Phalacrocorax brasilianus</i> R	<b>I</b> Gavilán mixto EA-B <i>Parabuteo unicinctus</i> R	<b>Scolopacidae</b> <b>F</b> Becasina común L <i>Gallinago paraguaiiae</i> MA	<b>III</b> Cuculillo canela B <i>Coccyzus melancoryphus</i> MA	<b>I</b> Chimango EA-B-P <i>Milvago chimango</i> R
<b>I</b> Coscoroba L <i>Coscoroba coscoroba</i> R	<b>Ardeidae</b> <b>I</b> Hocó colorado L-VP-C <i>Tigrisoma lineatum</i> R	<b>F</b> Aguilucho alas largas EA <i>Buteo albicaudatus</i> R	<b>Jacaniidae</b> <b>I</b> Jacana VP <i>Jacana jacana</i> R	<b>I</b> Pirincho A-B-P-T <i>Guira guira</i> R	<b>III</b> Halconcito colorado EA <i>Falco sparverius</i> R
<b>I</b> Pato de collar L <i>Callonetta leucophrys</i> R	<b>III</b> Mirasol común VP <i>Ixobrychus involucris</i> MA	<b>F</b> Águila mora EA <i>Geranoaetus malnoleucus</i> R	<b>Rostratulidae</b> <b>F</b> Aguatero VP <i>Nycticorax nycticorax</i> R	<b>F</b> Crespín A-B-P-T <i>Tapera naevia</i> MA	<b>III</b> Halcón peregrino EA <i>Falco peregrinus</i> RV
<b>I</b> Pato cutirí L <i>Amazonetta brasiliensis</i> R	<b>III</b> Garza bruja L-VP <i>Nycticorax nycticorax</i> R	<b>F</b> Aguilucho langostero EA <i>Buteo swainsoni</i> MB	<b>Laridae</b> <b>III</b> Gaviota capucho café EA-C <i>Chroicocephalus maculipennis</i> RI	<b>Strigidae</b> <b>F</b> Alilicucu común A-B <i>Megascops choliba</i> R	<b>Psittacidae</b> <b>I</b> Cotorra EA-B-A <i>Myiopsitta monachus</i> R
<b>I</b> Pato barcino L <i>Anas flavirostris</i> R	<b>III</b> Garcita azulada L-VP <i>Butorides striata</i> R	<b>I</b> Caraú L-VP <i>Aramides guarauna</i> R	<b>III</b> Gaviota capucho gris EA-C <i>Chroicocephalus cirrocephalus</i> RI	<b>III</b> Caburé chico A-B <i>Glaucidium brasilianum</i> R	<b>III</b> Catita chirirí EA-B <i>Brotogeris chiriri</i> FDE
<b>F</b> Pato maicero L <i>Anas georgica</i> R	<b>F</b> Garcita bueyera L-VP <i>Bubulcus ibis</i> R	<b>II</b> Ipacaá VP-T <i>Aramides ypecaha</i> R	<b>III</b> Gaviota cangrejera EA-C <i>Larus atlanticus</i> RI	<b>F</b> Lechuzón orejudo B <i>Pseudoscops clamator</i> R	<b>F</b> Loro hablador B <i>Amazona aestiva</i> FDE
<b>I</b> Pato capuchino L <i>Anas versicolor</i> R	<b>II</b> Garza mora VP-C <i>Ardea cocoi</i> R	<b>I</b> Chiricote VP-T <i>Aramides cajaneus</i> R	<b>III</b> Gaviota cocinera EA-C <i>Larus dominicanus</i> R	<b>F</b> Caprimulgidae <b>F</b> Nacundá B <i>Chordeiles nacunda</i> R	<b>F</b> Chiripepe cabeza verde EA-B <i>Pyrrhura frontalis</i> FDE
<b>III</b> Pato colorado L <i>Anas georgica</i> R	<b>I</b> Garza blanca EA-C <i>Ardea alba</i> R	<b>I</b> Burrito común VP <i>Laterallus melanophaius</i> R	<b>F</b> Gaviota lagunero EA-C <i>Sterna trudeaui</i> R	<b>III</b> Caprimulgidae <b>F</b> Atajcaminos tijera B-P <i>Hydropsalis torquata</i> MA	<b>I</b> Nanday B <i>Nandayus nenday</i> FDE
<b>F</b> Pato cuchara L <i>Anas cyanoptera</i> R	<b>III</b> Chiflón VP <i>Syrigma sibilatrix</i> R	<b>III</b> Burrito colorado VP <i>Laterallus leucopyrrhus</i> R	<b>III</b> Gaviota cangrejera EA-C <i>Larus atlanticus</i> RI	<b>Trochilidae</b> <b>I</b> Picaflor común A-B <i>Chlorostilbon lucidus</i> RV	<b>II</b> Calancate ala roja EA-B <i>Aratinga leucophthalma</i> FDE
<b>I</b> Pato picazo L <i>Netta peposaca</i> R	<b>II</b> Garcita blanca L-VP <i>Egretta thula</i> R	<b>F</b> Gallineta overa VP <i>Pardirallus maculatus</i> R	<b>F</b> Gaviotín lagunero EA-C <i>Sterna trudeaui</i> R	<b>I</b> Picaflor bronceado A-B <i>Hylocharis chrysura</i> RV	<b>Thamnophilidae</b> <b>F</b> Choca corona rojiza A-B <i>Thamnophilus ruficapillus</i> R
<b>III</b> Pato cabeza negra L <i>Heteronetta atricapilla</i> R	<b>Threskiornitidae</b> <b>II</b> Cuervillo de cañada L <i>Plegadis chihi</i> R	<b>II</b> Gallineta común VP <i>Pardirallus sanguinolentus</i> R	<b>Columbidae</b> <b>II</b> Torcacita común B-T <i>Columbina picui</i> R	<b>Alcedinidae</b> <b>III</b> Martín pescador chico L <i>Chloroceryle americana</i> R	<b>I</b> Chinchero chico B <i>Lepidocolaptes angustirostris</i> R
<b>F</b> Pato zambullidor chico L <i>Oxyura vittata</i> R	<b>II</b> Cuervillo cara pelada EA <i>Phimosus infuscatus</i> R	<b>I</b> Pollona negra L-VP <i>Gallinula cgaleata</i> R	<b>I</b> Paloma doméstica B-T <i>Columba livia</i> R	<b>Picidae</b> <b>III</b> Carpinterito común B <i>Picumnus cirratus</i> R	<b>I</b> Hornero T-P-B <i>Furnarius rufus</i> R
<b>I</b> Macá común L <i>Rollandia rolland</i> R	<b>III</b> Espátula rosada EA <i>Platalea ajaja</i> RV	<b>N</b> Pollona azul R <i>Porphyrio martinicus</i> R	<b>I</b> Paloma picazuro B-T <i>Patagioenas picazuro</i> R	<b>I</b> Junquero VP <i>Phleocryptes melanops</i> R	<b>F</b> Remolinera común T <i>Cinclodes fuscus</i> MAP
<b>N</b> Macá gris L <i>Tachybaptus dominicus</i> FD	<b>Accipitridae</b> <b>F</b> Milano blanco EA-B <i>Elanus leucurus</i> R	<b>II</b> Gallareta ligas rojas L-VP <i>Fulica armillata</i> R	<b>III</b> Paloma manchada B <i>Patagioenas maculosa</i> R	<b>I</b> Carpintero bataraz chico B <i>Veniliornis mixtus</i> R	<b>I</b> Espinero pecho manchado A-B-P <i>Phacellodomus striatocolis</i> R
<b>I</b> Macá pico grueso L <i>Podilymbus podiceps</i> R	<b>I</b> Gallareta escudete rojo L-VP <i>Fulica rufifrons</i> R				
<b>II</b> Macá grande C <i>Podiceps major</i> R					

HÁBITAT: VP: Vegetación palustre - EA: Espacio aéreo - A: Arbustal - B: Bosque - P: Pastizal - T: Terraplén - C: Costa del río. ESTATUS/ESTACIONALIDAD: R: Residente - RI: Residente Invernal - RV: Residente Estival - MB: Migrante estival no nidificante en esta zona - MA: Migrante

estival nidificante en esta zona - MAP: Migrante invernal no nidificante en esta zona - FD: Fuera de zona de distribución - FDE: FD Establecido. DETECTABILIDAD: I: Alta - II: Media - III: Baja - F: Fortuito - N: Nuevo

LISTA DE CAMPO DE LA RESERVA COSTANERA SUR - AVES REGISTRADAS (Mayo 2014 - Abril 2015)

Cora Rimoldi, J. Simón Tagtachian y Germán Pugnali - www.reservacostanera.com.ar

Furnariidae (cont)		Tyrannidae (cont.)		Hirundinidae (cont.)		Thraupidae		Cardinalidae		Icteridae	
<b>F</b> Canastero coludo	A-P	<b>II</b> Suirirí amarillo	VP-P-A	<b>I</b> Golondrina barranquera	EA	<b>I</b> Cardenal común	T-A-B	<b>III</b> Fueguero común	B	<b>II</b> Federal	VP
<i>Asthenes pyrrholeuca</i>	MAP	<i>Satrapa icterophrys</i>	R	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	R	<i>Paroaria coronata</i>	R	<i>Piranga flava</i>	R	<i>Amblyramphus holosericeus</i>	R
<b>III</b> Curutié ocráceo	P	<b>F</b> Dormilona cara negra	T	<b>I</b> Golondrina parda	EA-B	<b>I</b> Cardenilla	VP-T	<b>F</b> Reinamora chica	B	<b>III</b> Varillero negro	VP
<i>Cranioleuca sulphurifera</i>	R	<i>Muscisaxicola maclovianus</i>	MAP	<i>Progne tapera</i>	MA	<i>Paroaria capitata</i>	R	<i>Cyanoloxia glaucocaulera</i>	MA	<i>Agelasticus cyanopus</i>	R
<b>F</b> Curutié colorado	A	<b>F</b> Monjita gris	VP	<b>I</b> Golondrina doméstica	EA-B	<b>II</b> Frutero negro	B	<b>III</b> Reinamora grande	A-B	<b>II</b> Varillero ala amarilla	VP
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	R	<i>Xo9lmis cinereus</i>	MA	<i>Progne chalybea</i>	MA	<i>Tachyphonus rufus</i>	R	<i>Cyanocompsa brissonii</i>	R	<i>Agelasticus thilius</i>	R
<b>F</b> Chotoy	A	<b>F</b> Viudita blanca	VP	<b>F</b> Golondrina negra	EA-B	<b>F</b> Frutero azul	B	<b>III</b> Pepitero gris	B	<b>III</b> Varillero congo	VP
<i>Schoeniophylax phryganophilii</i>	R	<i>Fluvicola albiventer</i>	MA	<i>Progne elegans</i>	MA	<i>Stephanophorus diadematus</i>	R	<i>Saltator coerulescens</i>	R	<i>Chrysomus ruficapillus</i>	R
<b>III</b> Pijuí plumizo	A-B-P	<b>II</b> Picabuey	T-P	<b>I</b> Golondrina ceja blanca	EA-B	<b>F</b> Saíra de antifaz	B	<b>II</b> Pepitero verdoso	B	<b>I</b> Tordo músico	T-A-P
<i>Synallaxis spixi</i>	R	<i>Machetornis rixosa</i>	R	<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	MA	<i>Pipraeidea melanonota</i>	RI	<i>Saltator similis</i>	R	<i>Agelaioides badius</i>	R
<b>I</b> Pijuí frente gris	A-B-P	<b>I</b> Benteveo común	VP-A-P	<b>F</b> Golondrina zapadora	EA-B	<b>I</b> Naranjero	B	<b>I</b> Pepitero de collar	A-B	<b>III</b> Tordo pico corto	A-T
<i>Synallaxis frontalis</i>	R	<i>Pitangus sulphuratus</i>	R	<i>Riparia riparia</i>	MA	<i>Pipraeidea bonariensis</i>	R	<i>Saltator aurantirostris</i>	R	<i>Molothrus rufoaxillaris</i>	R
		<b>I</b> Benteveo rayado	B	<b>F</b> Golondrina rabadilla canela	EA-B	<b>II</b> Celestino	B			<b>III</b> Tordo de matorral	A-B
<b>Tyrannidae</b>		<i>Myiodynastes maculatus</i>	RV	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	MA	<i>Thraupis sayaca</i>	R	<b>Parulidae</b>		<i>Dives warszewiczi</i>	FD
<b>I</b> Fiofío pico corto	B	<b>F</b> Tuquito gris	B	<b>F</b> Golondrina tijerita	EA	<b>F</b> Cachilo canela	P-A	<b>II</b> Pitiayumí	B	<b>I</b> Tordo renegrido	T-A
<i>Elaenia parvirostris</i>	MA	<i>E. aurantioatrocristatus</i>	MA	<i>Hirundo rustica</i>	MA	<i>Donacospiza albifrons</i>	R	<i>Parula pitiayumi</i>	R	<i>Molothrus bonariensis</i>	R
<b>F</b> Pijito silbón	B	<b>I</b> Suirirí real	B-P			<b>I</b> Sietevestidos	A-P	<b>I</b> Arañero cara negra	A-VP-B	<b>III</b> Pecho colorado	P
<i>Campostoma obsoletum</i>	R	<i>Tyrannus melancholicus</i>	MA	<b>Troglodytidae</b>		<i>Poospiza nigrorufa</i>	R	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	MA	<i>Sturnella superciliaris</i>	RV
<b>F</b> Suirirí común	B	<b>I</b> Tijereta	B-P	<b>I</b> Ratona común	A-P-B	<b>III</b> Monterita litoraleña	B	<b>I</b> Arañero coronado chico	B	<b>Fringillidae</b>	
<i>Suiriri suiriri</i>	R	<i>Tyrannus savana</i>	MA	<i>Troglodytes aedon</i>	R	<i>Poospiza cabanisi</i>	R	<i>Basileuterus culicivorus</i>	R	<b>I</b> Cabecitanegra común	B-P-A
<b>F</b> Pijito gris	VP	<b>III</b> Burlisto pico canela	B	<b>Poliptilidae</b>		<b>II</b> Monterita cabeza negra	B			<i>Sporagra magellanica</i>	R
<i>Serpophaga nigricans</i>	R	<i>Myiarchus swainsoni</i>	MA	<b>I</b> Tacuarita azul	A-B	<i>Poospiza melanoleuca</i>	R	<b>Icteridae</b>			
<b>I</b> Pijito común	A-B			<i>Poliptila dumicola</i>	R	<b>I</b> Jilguero dorado	A-P	<b>I</b> Boyero negro	B	<b>Passeridae</b>	
<i>Serpophaga subcristata</i>	R	<b>Cotingidae</b>				<i>Sicalis flaveola</i>	R	<i>Cacicus solitarius</i>	R	<b>I</b> Gorrión	T-A
<b>I</b> Pijito trinador	A-B	<b>III</b> Cortarramas	A-B	<b>Turdidae</b>		<b>F</b> Misto	A-P	<i>Icterus pyrrhopterus</i>	R	<i>Passer domesticus</i>	FDE
<i>Serpophaga griseicapilla</i>	MAP	<i>Phytotoma rutila</i>	MAP	<b>I</b> Zorzal colorado	A-B-P-T	<i>Sicalis luteola</i>	R				
<b>F</b> Tachurí canela	A-B	<b>Tytiridae</b>		<i>Turdus rufiventris</i>	R	<b>III</b> Verdón	P-A-T	<i>Embernagra platensis</i>	R		
<i>Polystictus pectoralis</i>	MA	<b>F</b> Tijerilla	B	<b>I</b> Zorzal chalchalero	A-B-T	<b>F</b> Volatinero	P-VP	<i>Volatinia jacarina</i>	MA		
<b>III</b> Doradito común	VP-P	<i>Xenopsaris albinucha</i>	MA	<i>Turdus amaurochalinus</i>	R	<b>F</b> Corbatita dominó	P-VP	<i>Sporophila collaris</i>	R		
<i>Pseudocolopteryx flaviventris</i>	R	<b>F</b> Anambé verdoso	B	<b>Mimidae</b>		<i>Sporophila caerulea</i>	R	<i>Sporophila caerulea</i>	R		
<b>F</b> Barullero	A-B	<i>Pachyramphus viridis</i>	R	<b>I</b> Calandria grande	A-T	<b>I</b> Corbatita común	P-A	<b>F</b> Brasita de fuego	A		
<i>Euscarthmus meloryphus</i>	R	<b>I</b> Anambé común	B	<i>Mimus saturninus</i>	R	<b>F</b> Cardenal amarillo	P-A	<i>Coryphospingus cucullatus</i>	RI		
<b>III</b> Tachurí sietecolores	VP	<i>Pachyramphus polychopterus</i>	MA	<b>II</b> Calandria real	A-T	<i>Gubernatrix cristata</i>	R				
<i>Tachuris rubrigastra</i>	R	<b>Vireonidae</b>		<i>Mimus triurus</i>	MAP			<b>Emberizidae</b>			
<b>I</b> Mosqueta estriada	A-B	<b>F</b> Juan chiviro	B	<b>Sturnidae</b>		<b>F</b> Chingolo	T-P-A-B	<i>Zonotrichia capensis</i>	R		
<i>Myiophobus fasciatus</i>	MA	<i>Cyklarhis gujanensis</i>	MA	<b>F</b> Estornino crestado	B-VP						
<b>II</b> Churrinche	A-B	<b>I</b> Chiví común	B	<i>Acridotheres cristatellus</i>	FDE						
<i>Pyrocephalus rubinus</i>	MA	<i>Vireo olivaceus</i>	MA	<b>I</b> Estornino pinto	B-VP						
<b>F</b> Viudita pico celeste	B			<i>Sturnus vulgaris</i>	FDE						
<i>Knipolegus cyanirostris</i>	RI										
<b>I</b> Pico de plata	A-B-T										
<i>Hymenops perspicillatus</i>	R										



HÁBITAT: VP: Vegetación palustre - EA: Espacio aéreo - A: Arbustal - B: Bosque - P: Pastizal - T: Terraplén - C: Costa del río. ESTATUS/ESTACIONALIDAD: R: Residente - RI: Residente Invernal - RV: Residente Estival - MB: Migrante estival no nidificante en esta zona - MA: Migrante estival nidificante en esta zona - MAP: Migrante invernal no nidificante en esta zona - FD: Fuera de zona de distribución - FDE: FD Establecido. DETECTABILIDAD: I: Alta - II: Media - III: Baja - F: Fortuito - N: Nuevo

OBSERVACIONES: